

TYMAI

yra ūmi, itin užkrečiama virusinė infekcija, plintanti lašeliniu būdu per orą ir pasireiškianti karščiavimu, bėrimu ir kvėpavimo takų bei akių junginės uždegimu.

Tymai – infekcija, valdoma skiepais.

Tymų virusas

yra ypač lakus, plinta oro srautais pastato ribose.

Tymai plinta kalbant, čiaudint, kosint

Tymų virusas su seilių lašeliais aplinkoje išsilaiko iki 2 val.

Tymams imlūs

asmenys, nesirgę tymais, neskiepyti arba paskiepyti ne visu vakcinacijos kursu (2 vakcinacijos dozėmis).



Sergantis žmogus

gali užkrėsti aplinkinius 3–5 dienas iki bėrimo ir 4 dienas po bėrimo.

Jeigu asmuo nėra sirgęs tymais

ir nėra skiepytas nuo tymų, tikimybė užsikrėsti po kontakto su sergančiu asmeniu siekia net 90–95 proc.

Vienas sergantis

asmuo gali užkrėsti apie 18 žmonių.



SIMPTOMAI

Staigus karščiavimas

(38–39 °C), kosulys, sloga, jautrumas šviesai.



Bėrimas

Po kelių dienų atsiranda specifinis makulopapulinis bėrimas, kuris neniežti. Bėrimas paprastai pasireiškia 3–7 ligos dieną. Pirmieji bėrimo elementai atsiranda ausų, veido, kaklo srityje, vėliau išberia liemenį, rankas, šlaunis, blauzdas.

Gydymas

Jeigu pastebėjote, kad vaikas sunegalavo (temperatūra, kosulys, akys bijo šviesos), nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Polocko g. 12-2, Vilnius LT-01204
Tel. (8 5) 234 0235
El. p. info@wsb.lt
www.wsb.lt